

الوقاية من المستحضر :

يجب عدم لمس المستحضر للوجه والاعين
بعد نهاية العمل يجب غسل اليدين بالصابون والماء جيدا .
يجب استعمال قفازات .

التخزين :

حماية المستحضر من الضوء ويجب ان يكون محفوظا في اكياس خاصة
تجنب الحرارة العالية من فوق 20⁰ واشعة الشمس
وضع ما تبقى من المستحضرات عند فتح الاكياس في البراد +5⁰ او في التلاجة (-20⁰) تبقى صالحة
للاستعمال (سنتين)

ازالة المستحضر واتلافه

المستحضر يمكن ازالته في آخر الخريف او تركه لأنه يحتوي على فيرمون قليل .
عند ازالته بالامكان رميه في النفايات العادية

الشركة غير مسؤولة عندما لا يتم الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الشركة لناحية الاستعمال والتخزين
والمحافظة على ظروف العمل المنظمة من قبل الشركة .

الشركة الموزعه:

الشركة المصنعة:
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd
Jaban


EVIX PLUS
S.A.R.L.
Lebanon - Beirut
Ramlet El Bayda
Bank Lebanon and Gulf
4th Floor
Phone: +961 (0)1 792 024
Email: evixplus@evixgroup.com
www.evixgroup.com

أين يجب ان تعلق ؟

- يتم تعليق الشريط بنعومة بعدم كسره على الشجرة -
- يعلق شريط واحد على كل ثلاث شجرات داخل البستان
- يعلق شريط واحد على كل شجرة من الصفين الأولين
- يزداد عدد الشرائط في المنطقة المواجهة للرياح

تعلق في الثلث الأخير من أعلى الشجرة . و إذا كانت الأشجار عالية علينا ان نغير في التوزيع ثلث
الكمية على الثلث الأعلى والباقي في الثلثين الأسفلين

في العادة تكفي الكمية المخصصة من الفيرومون لكل نوع من الأشجار ولكن في الحالات الخاصة
اي عند وجود غابات او مزروعات مختلفة . أنهار وغيرها . علينا ان نحمل الحقل باستعمال أكثر من
الشرائط (رجاء النظر الى الصورة)



في حال وجود انارة قريبة للحقل المعالج (مثل انارة الطرق) علينا ان نزيد من توزيع الشرائط بأعداد أكثر
فحص الحقل بشكل مستمر ومنظم . وذلك من خلال استعمال المصائد ومراقبة الحشرات و مراقبة الإصابة .

مراقبة الثمار المصابة بالحشرات وتعدادها كل مرة وتدوينها

حتى لو لم نجد حشرات في المصائد هذا لا يعني انه ليس هناك حشرات . لذلك يجب مراقبة الثمار وإذا
وجدنا إصابات علينا المعالجة بالمبيد الحشري المناسب (insecticides)



Isomate C plus

عثة ثمار التفاح *Cydia pomonella*

المادة الفعالة : E,E-8,10DDDOL + 1-DDOL + 1-TDOL

محتوى الوحدة : 188 mg بالشريط

طريقة العمل بهذه التقنية الجديدة تتركز على التالي :

ضباع الاتجاه عند الذكور . لذلك يصعب على الذكور اتباع الطريق والوصول الى الأنثى واتمام عملية
التلقيح .

طريقة الأستعمال :

Isomate C plus *Cydia pomonella* بالدم ١٠٠ - ٥٠

تاريخ البدء بالأستعمال:

يجب البدء بنشرها عندما نلاحظ اول حشرة اول الحقل او قبلها بأسبوع عادة أول نيسان

الى اوائل ايار نعثة ثمار التفاح

يجب نشر المصائد المناسبة مع الفورمونات المركزة الخاصة ومراقبة الحشرات وتعدادها وعمل جدول بها و الرش
حسب وجود الحشرات وكثرتها في المصائد مع مراقبة الإصابة على الثمار

التوزيع :

هذه الشرائط يوجد بها الفيرومون الذي ينتشر او يتطاير بشكل دائم الى مدة حوالي 180 يوما .

توزيعها على اول صفين على الأطراف بكثافة و إذا كان هناك سياج يجب وضعها او توزيعها على
السياج ايضا

. توزيعها بشكل منتاسق في داخل البستان

وفي امكنة خطرة مثلا طرقات . ماء . غابات . توزع بشكل كثف

Exp. :

Prod. :

Batch No. :

サイズ : 170×400mm (カド角)

H25.1.23 (初回)

〈注〉 マッキントッシュによるデザイン提案は、実際のインクにて表現しているわけでは
ありませんので、色校正とは違います。